

Дополнения к фауне птиц Терского берега Белого моря

Терский берег Кольского полуострова остаётся одним из наименее изученных его участков. Имеющиеся публикации по птицам Терского берега относятся к небольшой его части, от с. Чапома до р. Пулоньги (Малышевский, 1962, 1963; Коханов, 1975).

С 26.VII по 7.IX.2000 и с 4.VII по 28.VIII.2001 мы провели обследование окрестностей с. Чаваньга (Терский р-н Мурманской обл.). Наиболее полно исследована территория, заключённая между 66°00'40" с.ш. и 66°20'40" с.ш., 37°35' в.д. и 38°40' в.д., а также полоса побережья к западу до 36°55' в.д. Осмотрено побережье Белого моря от устья р. Варзуги до устья р. Стрельны, долины рек Чаваньги, Малой Чаваньги, Чёрной и Стрельны, ручьёв Гремяха, Заборного, Ромбач; южная часть системы Ондомозёр.

Берег моря в районе работ пологий; литораль илистая. По побережью тянется неширокая полоса болот переходного типа, с отдельными небольшими водоёмами. Дальше от берега, среди лесов и верховых болот, лежат отдельные небольшие озёра, часто с заболоченными берегами, преимущественно без надводной растительности. В 30 км от моря находится система Ондомозёр, включающая несколько крупных и ряд расположенных у их берегов мелких озёр, с песчаными или заболоченными берегами, без надводной растительности. В исследованном районе есть несколько рек и ручьёв с быстрым течением. Большая часть территории занята верховыми болотами и редкоствольными елово-берёзовыми лесами, ближе к Ондомозёрам – сосновыми. Более густые смешанные леса (с преобладанием ели) развиты местами в долинах рек, наиболее обычны в долине р. Стрельны.

В настоящем сообщении мы приводим информацию по птицам, не встреченным Р.И. Малышевским (1962, 1963) и В.Д. Кохановым (1975), и по тем видам, статус которых был уточнён нашими исследованиями. Информация по гусеобразным птицам опубликована отдельными сообщениями (Квартальнов и др., 2003; Квартальнов и др., *в печати*).

Глупыш (*Fulmarus glacialis*). Мумифицированные останки и череп, принадлежащие одной или двум птицам, найдены в 2001 г. на берегу моря близ с. Чаваньги.

Северная олуша (*Sula bassana*). Одну птицу видели 4.VII.01 в море на траверсе устья р. Варзуги.

Тетеревятник (*Accipiter gentilis*). 16-18.VIII.00 близ с. Чаваньга три раза отмечали взрослую самку. 1-3.IX.00 на берегу моря в месте впадения руч. Вонючего держался молодой тетеревятник. Молодая птица встречена близ с. Чаваньга и в конце августа 2001 г. На широкое распространение тетеревятника на Кольском п-ве указывает С.А. Ганусевич (1988).

Перепелятник (*Accipiter nisus*). 15.VIII.00 в районе устья руч. Вонючий перепелятника преследовали серые вороны. На Нижнем Ондомозере перепелятник встречен 23.VIII.00, в 2001 г. здесь же найдены перья погибшей птицы. 30.VII.01 ястреб охотился в долине р. Стрельна. О встречах перепелятника в районе Ондомозёр упоминает С.А. Ганусевич (1988).

Обыкновенный канюк (*Buteo buteo*). 18.VIII.00 канюк летел над берегом моря к западу от устья Чаваньги. Одна птица встречена 12.VII.01 в островке смешанного леса на верховом болоте близ оз. Ю. Гремяцкого.

Беркут (*Aquila chrysaetos*). Пара беркутов, по-видимому, гнездится на Ондомозёрах. Двух птиц видели на Верхнем Ондомозере 26.VIII.00. 28.VIII.00 здесь же видели летящую взрослую птицу и молодого беркута, кормящегося на туше северного оленя. Одиночных взрослых птиц отмечали здесь же 26-27.VII.01.

Сапсан (*Falco peregrinus*). Оставленное птицами гнездо найдено 9.VII.01 на скальном уступе над водопадом Падун (р. Чаваньга); в тот же день в 0.5 км выше по течению реки встречены два взрослых и один молодой сапсан. В августе и начале сентября 2000 и 2001 гг. несколько раз наблюдали охотящихся птиц на берегу моря у с. Чаваньга.

Чеглок (*Falco subbuteo*). 9.VII.01 охотящийся чеглок схватил птенца из выводка **фифи** (*Tringa glareola*) на берегу озера у р. М. Чаваньги.

Обыкновенная пустельга (*Falco tinnunculus*). Один самец охотился 5.VIII.00 над прибрежными болотами у моря в районе руч. Вонючего. В этом же месте в 2001 г. найдено крыло самки пустельги.

Тундряная куропатка (*Lagopus mutus*). Редкий гнездящийся вид: 11.VIII.00 самку с выводком из 6 молодых подняли в тундрах с вороничника на приморской возвышенности (близ с. Чаваньга); 12.VII.01 две взрослых куропатки и один лётный птенец встречены на вороничнике у руч. Гремяхи.

Тетерев (*Lyrurus tetrix*). По сведениям от местных охотников, тетерев был обычен в окрестностях Чаваньги в 70-е годы XX века. В период наших работ не встречен.

Рябчик (*Tetrastes bonasia*). В небольшом числе обитает во влажных ельниках по берегам водоёмов. Пару взрослых птиц с лётным выводком (не менее 4-х молодых) подняли 10.VIII.00 в долине р. Чаваньги. Ниже по течению ещё двух птиц видели 29.VIII.00. 16.VIII.00 два рябчика встречены близ оз. Берёзовского. Согласно опросным сведениям, численность рябчика в окрестностях Чаваньги всегда была низкой, но относительно стабильной.

Малый зуёк (*Charadrius dubius*). Три птицы встречены на литорали у с. Чаваньга 6.VII.01. 11.VII.01 малый зуёк отводил человека по песчаной дороге у моря на восточной окраине с. Чаваньга; гнезда его найти не удалось, позже птица здесь не была встречена. 18.VII.01 на море к западу от с. Чаваньга кормилась стайка из 6 птиц.

Черныш (*Tringa ochropus*). 28.VII.01 три раза видели черныша (возможно, одну и ту же особь), кормящегося со стайкой фифи на р. Чёрная, в 34 км от моря.

Травник (*Tringa totanus*). Гнездится на переходных болотах у берега моря: численность составляет до 0.4 пар на км берега. 17.VII.01 травник взлетел со сфагнумовой кочки, где обогревал трёх недавно вылупившихся пуховых птенцов. Нелётного оперённого птенца наблюдали 9-11.VIII на литорали близ места впадения р. Вонючего. Вставших на крыло молодых отмечали на приморских болотах и на берегу моря начиная с 17.VIII.01. В 2001 г. численность кочующих и пролётных травников на берегу моря составила: в июле – 0.6 ос./км, в августе – 1.6 ос./км.

Щёголь (*Tringa erythropus*). В.Д. Коханов (1975) приводит щёголя в качестве пролётного вида. Предположительно гнездится в районе наших работ: 13.VII.01 пара беспокоилась на заболоченной луговине у р. М. Чаваньги. Один беспокоящийся щёголь отмечен 17.VII.01 на переходном болоте в 1 км от моря, у восточной окраины оз. Могилевского. На пролёте и кочёвках щёголи

встречаются как по берегу моря, на и на удалённых от моря озёрах (встречены на Среднем Ондомозере, озёрах Могилевском и Берёзовском).

Краснозобик (*Calidris ferruginea*). В небольшом числе, поодиночке и группами до 8 птиц, краснозобики встречаются в июле и августе по берегу моря. В 2001 г. численность составила около 0.5 особей на км побережья.

Исландский песочник (*Calidris canutus*). Поодиночке и стайками до 15 птиц встречались по берегу моря в августе 2001 г. Численность составляла до 0.8 особей на км побережья.

Средний поморник (*Stercorarius pomarinus*). Одна птица летела над морем 4.VII.01, на траверсе устья р. Варзуги. Взрослую самку с перебитым крылом подобрали 31.VII.01 на колонии **полярных крачек** (*Sterna paradisaea*) в устье р. Чаваньга; птица доставлена в Московский зоопарк.

Малая чайка (*Larus minutus*). Одна взрослая птица и два первогодка встречены 26.VII.01 на Верхнем Ондомозере. 4-6.VIII.01 отмечено четыре встречи молодых малых чаек (по 1-3 птицы) на побережье моря от с. Чапома до с. Чаваньга. На море малые чайки появились после прошедшего шторма, также как клуши и **бургомистры** (*Larus hyperboreus*).

Озёрная чайка (*Larus ridibundus*). Вставшая на крыло молодая птица встречена в устье Чаваньги 9.VII.01.

Клуша (*Larus fuscus*). Одиночных взрослых птиц регулярно отмечали на берегу моря. После прошедшего в конце июля 2001 г. шторма число встреч увеличилось, численность клуши достигала 0.4 особей на км берега. Одна птица держалась у рыбацкой избушки близ устья руч. Шумиловский 17.VII-6.VIII.01. 7.VIII.01 взрослая чайка беспокойно окрикивала и пыталась нападать на человека на берегу моря у с. Чаваньга; здесь же встречен лётный птенец этого вида. Убедительных свидетельств гнездования клуши в районе наших наблюдений нет.

Морская чайка (*Larus marinus*). В небольшом числе гнездится у с. Чаваньга, в смешанных колониях с **серебристой чайкой** (*Larus argentatus*) и **северной хохотуньей** (*Larus heuglini*). Три пары проявляли беспокойство при приближении человека 11.VII.01 на г. Кладбищенской. Две пары гнездились в устье р. Чаваньги: 11.VIII.01 здесь встречены два оперённых разновозрастных птенца этого вида, оба нелётные. В небольшом числе взрослые и вставшие на крыло молодые птицы отмечены на других обследованных участках побережья.

Гагарка (*Alca torda*). Одна птица летела над морем в сторону берега 4.VII.01, напротив устья руч. Гремяхи. 12.VII.01 гагарка отдыхала на прибрежных камнях в месте впадения руч. Ромбача. Погибшая птица найдена в августе 2001 г. на берегу моря у с. Чаваньга.

Обыкновенный чистик (*Cerphus grylle*). Скопление чистиков отмечено в море к востоку от впадения р. Варзуги 7.IX.00.

Вяхирь (*Columba palumbus*). 12.VII.01 одна птица прилетела со стороны леса на берег моря, у места впадения руч. Вонючего. По-видимому, эта же птица была встречена там и на следующий день.

Сизый голубь (*Columba livia*). Залётный вид: в сёлах Чаваньга и Тетрино не гнездится. Фрагмент крыла найден в с. Чаваньга в 2000 г.

Мохноногий сыч (*Aegolius funereus*). Птица, погибшая в сети, развешанной (для ловли куропаток) на краю ельника в долине руч. Трубногo, найдена 4.IX.00.

Желна (*Dryocopus martius*). Редкий, возможно гнездящийся вид. Крики птиц слышали 10.VII.01 в ельнике у р. Чаваньги. В этом же месте взрослая птица встречена 8.VII.01.

Большой пёстрый дятел (*Dendrocopos major*). Гнездится в небольшом числе на Ондомозёрских Кейвах и в долине р. Стрельны, где 22.VII-2.VIII.01 отмечены как взрослые, так и вставшие на крыло молодые птицы: всего 7 встреч.

Малый пёстрый дятел (*Dendrocopos minor*). Мумифицированный череп самца найден в августе 2001 г. на песчаных дюнах в устье р. Чаваньги. Самец этого вида встречен на Терском берегу Р.И. Малышевским (1962).

Трёхпалый дятел (*Picooides trydactylus*). Редкий, возможно гнездящийся вид. Несколько раз взрослых птиц встречали на возвышенностях Ондомозёрские Кейвы, на оз. Чёрном и в долине р. Стрельны в июле и августе 2000-01 гг.

Городская ласточка (*Delichon urbica*). Обычна на гнездовании в сёлах Чаваньга и Тетрино. Оперённый, но ещё не умеющий летать, птенец выпал из гнезда в с. Чаваньга 28.VII.01. Вылет птенцов из другого гнезда наблюдали 19.VIII.00. Вдали от населённых пунктов в период гнездования не встречается.

Лесной конёк (*Anthus trivialis*). Немногочислен на гнездовании в светлых березняках по побережью моря. Слётки встречены в период 8.VII-18.VIII.01. На пролёте встречается повсеместно.

Обыкновенный жулан (*Lanius collurio*). Самец (вероятно, залётный) сидел 11.VIII.00 в кустарнике на левом берегу р. Чаваньги, недалеко от устья.

Серый сорокопут (*Lanius excubitor*). Обычен на гнездовании. Пары с подростками слётками (до 4 птенцов в выводке) отмечены на верховых болотах, неподалёку от моря. Территориальные пары и отдельных взрослых птиц встречали также на берегу моря и на Ондомозёрах.

Кукша (*Perisoreus infaustus*). Немногочисленна, по-видимому, гнездится. Редка в лесах у побережья моря, где несколько раз отмечали пары и отдельных птиц. Чаще кукш встречали на Чаваньгских и Ондомозёрских Кейвах, где отмечены и небольшие группы (возможно, нераспавшиеся выводки). Довольно обычна в долине р. Стрельны (численность там составила не менее 0.3 особей на км долины).

Сойка (*Garrulus glandarius*). Две сойки проявляли беспокойство 28.VII.01 на берегу оз. Чёрном (система Ондомозёр). Характер их пребывания остался не ясен.

Крапивник (*Troglodytes troglodytes*). Гнездится в высокоствольных ельниках в долине р. Стрельны. Численность (по учётам 2001 г.) составляет не менее 0.15 пар на км долины. Выводки встречены 1.VIII (4 птенца) и 3.VIII.01 (5 птенцов). 10.VIII.00 один крапивник перемещался с тревожным криком во влажном ельнике с буреломом в долине р. Чаваньги. 13.VIII.00 крапивник беспокоился в смешанном лесу близ с. Чаваньга.

Лесная завирушка (*Prunella modularis*). Пение отмечено 8.VII.01 в смешанном лесу в долине р. Чаваньги. Одна взрослая птица кормилась 30.VII.01 на берегу р. Стрельна.

Садовая славка (*Sylvia borin*). Один самец пел 8.VII.01 в ивняках в долине р. Чаваньги, в 8 км от устья.

Славка-завирушка (*Sylvia curruca*). Взрослая птица кормилась в низкорослом ельнике у устья руч. Вонючего 19.VIII.00.

Пеночка-теньковка (*Phylloscopus collybita*). 15.VII.01 птица собирала корм для птенцов в кронах берёз в редкоствольном смешанном лесу к югу от оз. Берёзовского. 1.VIII.01 теньковка встречена в заболоченном ольшанике в долине р. Стрельны.

Пеночка-таловка (*Phylloscopus borealis*). Гнездится во влажных ельниках по долинам рек. 24.VII.01 недавно покинувший гнездо выводок встречен на берегу протоки Юрос (Ондомозёра). Численность таловок в долине Стрельны составляла не менее 0.5 пар на км долины: 29.VII-3.VIII.01 там отмечены нераспавшиеся выводки, ещё докармливаемые взрослыми. 10.VIII.00 таловки встречены в долине р. Чаваньги, 3.VIII.01 – в берёзовом криволесье на берегу моря у к востоку от с. Тетрино.

Желтоголовый королёк (*Regulus regulus*). В небольшом числе встречается по всей территории, обычен только во влажных ельниках по р. Стрельне. Там 29.VII-3.VIII.01 встречали стайки корольков, включающие как взрослых, так и молодых птиц.

Серая мухоловка (*Muscicapa striata*). Встречается по всей исследованной территории, обычна только в долинах рек и ручьёв. В июле отмечены птицы, собирающие корм для птенцов. Слётки встречены 24.VII.01 на берегу протоки Юрос (Ондомозёра).

Зарянка (*Erithacus rubecula*). В небольшом числе гнездится в ельниках по долинам рек и ручьёв. Обычна в долине р. Стрельны. Выводок, недавно покинувший гнездо (не менее 3 птенцов), встречен 29.VII.01. Одного слётка видели 1.VIII.01. В конце августа пролётные птицы встречаются по всему исследованному району.

Деряба (*Turdus viscivorus*). Редок, возможно, гнездится. 28.VIII.00 три молодые птицы отмечены в стае **белобровиков** (*Turdus iliacus*) в смешанном лесу у Верхнего Ондомозера.

Большая синица (*Parus major*). Немногочисленна, встречается преимущественно по долинам рек и ручьёв. Выводки отмечены 12.VII.01 в долине руч. Гремяхи (не менее 10 слётков) и 3.VIII.01 в долине нижнего течения р. Стрельна.

Обыкновенная пищуха (*Certhia familiaris*). Один выводок (не менее 4 слётков, с остатками птенцового пуха на голове) встречен 3.VIII.01 в высокоствольном березняке в долине р. Стрельны.

Полевой воробей (*Passer montanus*). Залётный вид. Стайка из 7 птиц отмечена в с. Чаваньга 4.VII.01.

Чиж (*Spinus spinus*). Немногочислен на гнездовании. В июле чижи отмечены один раз в долине р. Чаваньги (8.VII.01) и неоднократно – на р. Стрельне, где отмечены отдельные пары, небольшие стайки и вставшие на крыло выводки (слётки ещё выпрашивали корм). В августе кочующие стаи чижей обычны по всей исследованной территории.

Клёст-сосновик (*Loxia pytyopsittacus*). Встречи птиц приурочены к участкам спелых высокоствольных ельников в долинах рек. Отмечены как отдельные птицы (в том числе – поющие самцы), так и небольшие группы (до 4 птиц, в том числе и взрослые с подростками слётками). Остаётся неясным, гнездится ли этот вид в районе исследований.

Клёст-еловик (*Loxia curvirostra*). Редкий в 2000, но обычный, местами многочисленный вид в 2001 г. В 2001 г. первые стаи клестов у побережья моря встречены 17.VII; еловики были обычны в лесах на Ондомозёрах и в долине р. Стрельне. На Стрельне стаи состояли из взрослых и молодых птиц. По

приблизительной оценке, их численность составляла 35-40 особей на км долины.

Овсянка-ремез (*Emberiza rustica*). Редка на гнездовании. Две птицы (самка и молодая) встречены 17.VIII.00 на краю верхового болота западнее оз. Могилевское. Трёх овсянок (взрослую и 2 молодых) видели 18.VIII.00 на руч. Гремяхе. 8.VII.01 пара отмечена во влажном ельнике в долине р. Чаваньги. Одна птица отмечена 7.VIII.01 в березняке у оз. Мелком (система Ондомозёр).

Всего в 2000-01 гг. в окрестностях с. Чаваньга отмечены 148 видов птиц. Фауна южной и восточной частей Терского берега, по данным наших работ (см. также: Квартальнов и др., 2003; Квартальнов и др., *в печати*) и исследований Р.И. Малышевского (1962, 1963) и В.Д. Коханова (1975) составляет 161 вид. Ещё несколько видов птиц указаны только для северной части Терского берега (устье Поноя и горло Белого моря), значительно отличающейся как по своим ландшафтным особенностям, так и по положению относительно путей пролёта мигрирующих птиц (Михайлов, Черенков, 1984; Фильчагов, Черенков, 1984; и др.).

Значительное число видов впервые отмечено нами для Терского берега: это позволяет утверждать, что инвентаризация фауны данного района далека от завершения. Для целого ряда видов не выяснен статус их пребывания.

Работа финансирована BP Conservation programme, UK (грант № 1084) и Whitley Award Foundation (Rufford Small Grant for 2001). Мы благодарны С.В. Ковальскому, организовавшему экспедицию "Терский Берег", и А.С. Корякину, оказывавшему научную консультацию нашей работы. За гостеприимство и помощь в проведении исследований мы особо признательны В.Л. Бурцевой и Инге Бурцевой.

Литература

Квартальнов П.В., Литвинова Е.М., Эрнандес-Бланко Х.А. 2003. Новые сведения о гусеобразных Терского берега Белого моря. – Современное состояние популяций, управление ресурсами и охрана гусеобразных птиц Северной Евразии. Петрозаводск: 66-67.

Квартальнов П.В., Литвинова Е.М., Эрнандес-Бланко Х.А., Гречаная Н.В. Летняя фауна гусеобразных Терского берега Белого моря. – Казарка. Вып. 9. М.: *в печати*.

Коханов В.Д. 1975. К авиафауне Терского берега Белого моря. – Естественная среда и биологические ресурсы Крайнего Севера. Л.: 28–33.

Малышевский Р.И. 1962. Летние наблюдения над птицами Терского берега Белого моря. – Орнитология, 5: 13–27.

Малышевский Р.И. 1963. Ещё раз о летней орнитофауне Терского берега Белого моря. – Орнитология, 6: 475.

Михайлов К.Е., Фильчагов А.В. 1984. Особенности распространения и расселения некоторых видов птиц в тундре Кольского полуострова. – Орнитология, 19: 22-29.

Фильчагов А.В., Черенков А.Е. 1984. Численность водоплавающих птиц на восточном побережье Кольского полуострова. – Орнитология, 19: 215–216.

П.В. Квартальнов, Е.М. Литвинова, Х.А. Эрнандес-Бланко, А.А. Тупикин, Н.В. Гречаная

*Биологический ф-т МГУ им. М. В. Ломоносова, 119889, г. Москва, Воробьёвы
горы*

cettia@yandex.ru

Additions to the bird fauna of the Tersky Coast, the White Sea

P.V. Kvartalnov, E.M. Litvinova, J.A. Hernandez-Blanco, A.A. Tupikin, N.V.
Grechanaya

Biological Faculty, Moscow State University, Vorobyovy Gory, Moscow, 119899

cettia@yandex.ru